Arkhimédész törvénye

Nagy
Tamás
Paskelbė Nagy Tamás - 2025. 04. 01., k – 23:24
Pamokos / projekto plano tipas
Pamokos planas
Sektorius
Pedagógia, oktatás
Tema, mokymosi sritis
Hidrosztatika
Profesinis (-iai) dalykas (-ai)
Fizika
Klasė
10. évfolyam
Mokymosi ir ugdymo tikslai
Az órán megtanuljuk,hogy mitől függ egy folyadékba meritett test súlya és hogy miért úsznak vagy merülnek el a testek.
Sąvokos
folyadékok, nyomás, felhajtóerő,sűrűség
Reikalingos priemonės
internet, számológép
Įvadinė dalis ir pamokos / projekto plano rengimas

A folyadékokkal és a testek úszásával kapcsolatos kérdések felvetése. Közös ötletelés, példák keresése.

Pamokos / projekto įgyvendinimo planas

Archimédész törvénye (10 perc)

- **Definíció**: Archimédész törvénye szerint „A folyadékra vagy gázra ható felhajtóerő nagysága megegyezik a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával.”
- **Magyarázat**: A test a vízben egy felhajtóerőt tapasztal, amely a test által kiszorított víz súlyával egyenlő. Ez az erő irányában ellentétes a gravitációs erővel.

A felhajtóerő számítása (10 perc)

- **Formula**:
  Ffel=ρ·V·g
  ahol:
  - Ffel= felhajtóerő (N)
  - ρ = a folyadék sűrűsége (kg/m³)
  - V= a test által kiszorított folyadék térfogata (m³)
  - g = gravitációs gyorsulás (9,81 m/s²)
    Példa számítással:
    Egy 0,5 m³ térfogatú testet helyezünk a vízbe, ahol a víz sűrűsége 1000 kg/m³.
  - Ffel=1000·0,5·9,81=4905 N
  - Tehát a felhajtóerő 4905 N lesz.

Naudotos skaitmeninės priemonės
ChatGPT
Vertinimo planas

Szóbeli és írásbeli számonkérés

Namų darbai, projekto užduotis

Feladat 1:
Egy 2 m³ térfogatú fémtestet helyezünk egy tóba. A víz sűrűsége 1000 kg/m³. Mekkora a felhajtóerő, amely a testre hat?

Feladat 2:
Egy hajó úszik a vízen. A hajó tömege 10 000 kg, és a víz sűrűsége 1000 kg/m³. Mekkora a felhajtóerő, ha a hajó 2 m³ víz térfogatot kiszorít?

Bendrasis (-ieji) dalykas (-ai)
fizika